Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Eduard Weyr; T. Havlíček

Úlohy

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 1 (1872), No. 4, 207--214

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/122700>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1872

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

Úlohy.

I. Z matematiky.

Řešení úlohy 15.

(Podává Ed. Weyr.)

Má se určití a geometricky vyložití integrál rovnice

$$(2y - 3z) \frac{\partial z}{\partial x} + 2(2z - x) \frac{\partial z}{\partial y} = 3x - 4y.$$

Jsou-li

$$F_1(x, y, z) = C_1,$$

$$F_2(x, y, z) = C_2$$

integrály následujících dvou diferenciálních rovnic

$$\frac{dx}{2y-3z} = \frac{dy}{2(2z-x)} = \frac{dz}{3x-4y},$$

bude, jak známo,

$$\Phi(F_1, F_2) = 0$$

všeobecným integrálem dané rovnice diferenciální.

V tomto zvláštním případě můžeme si snadno takové dva integrály F_1, F_2 zjednatí, neboť dle posledních rovnic můžeme položití

$$dx = (2y - 3z) dt,$$

$$dy = 2(2z - x) dt,$$

$$dz = (3x - 4y) dt.$$

Násobíme-li první z těchto rovnic číslem 4, druhou 3, a poslední 2, obdržíme, sečteme-li pak,

$$4dx + 3dy + 2dz = 0,$$

a integrujeme-li teď,

$$F_1 = 4x + 3y + 2z = C_1,$$

což jest jedním z hledaných integrálů.

Násobíme-li však tytéž rovnice, jak po sobě jdou, činiteli x, y, z a sečteme-li, obdržíme patrně

$$xdx + ydy + zdz = 0,$$

a integrujeme-li,

$$F_2 = x^2 + y^2 + z^2 = C_2.$$

Za tou příčinou jest

$$\Phi(4x + 3y + 2z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

hledaný integrál všeobecný.

Geometrický význam jeho jest patrný; neboť rovná-li se $x^2 + y^2 + z^2$ stálé, musí též $2x + 3y + 2z = \text{stálé}$, z čehož jde, že plocha $\Phi = 0$ obsahuje průseky koulí

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

s rovnoběžnými rovinami

$$4x + 3y + 2z = m,$$

kdež r^2 závisí na m tak, že

$$\Phi(m, r^2) = 0.$$

Integrál všeobecný značí tudíž *rotační plochy*, jichž osa prochází počátkem souřadnic a má rovnice

$$\frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}.$$

Poznámka. Integrovaná částečná diferenciální rovnice jest obsažena ve všeobecnější rovnici

$$(a_1x + a_2y + a_3z + a_4) \frac{\partial z}{\partial x} + (b_1x + b_2y + b_3z + b_4) \frac{\partial z}{\partial y} = c_1x + c_2y + c_3z + c_4, \quad (1)$$

kterouž při této příležitosti, pokud vím, způsobem novým též integrovati hodlám. — Položme za tím účelem

$$\begin{aligned} dt &= \frac{dx}{a_1x + a_2y + a_3z + a_4} \\ &= \frac{dy}{b_1x + b_2y + b_3z + b_4} \\ &= \frac{dz}{c_1x + c_2y + c_3z + c_4}. \end{aligned} \quad (2)$$

Zjednáme-li si tu oba integrály

$$F_1(x, y, z) = C_1,$$

$$F_2(x, y, z) = C_2,$$

bude opět všeobecným integrálem rovnice (1)

$$\Phi(F_1, F_2) = 0,$$

kdež Φ značí libovolnou funkci.

Znásobíme-li čitatele i jmenovatele zlomků (2), jak po sobě jdou, neurčitými koeficienty α, β, γ , a položíme-li

$$a_1\alpha + b_1\beta + c_1\gamma = n\alpha,$$

$$a_2\alpha + b_2\beta + c_2\gamma = n\beta,$$

$$\begin{aligned}a_3\alpha + b_3\beta + c_3\gamma &= n\gamma, \\a_4\alpha + b_4\beta + c_4\gamma &= B,\end{aligned}$$

z čehož jde též

$$\begin{aligned}(a_1 - n)\alpha + b_1\beta + c_1\gamma &= 0, \\a_2\alpha + (b_2 - n)\beta + c_2\gamma &= 0, \\a_3\alpha + b_3\beta + (c_3 - n)\gamma &= 0,\end{aligned}\quad (3)$$

při čemž značí n taktéž neurčitý koeficient, obdržíme snadno ze soustavy (2)

$$dt = \frac{\alpha dx + \beta dy + \gamma dz}{n(\alpha x + \beta y + \gamma z) + B} \quad (4)$$

Hodnota veličiny n ustanoví se vyloučením α, β, γ z rovnic (3), čímž se obdrží rovnice stupně třetího podle n

$$\begin{vmatrix} a_1 - n & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 - n & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 - n \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Předpokládejme, že nižádný z kořenů této rovnice nerovná se 0, že tedy determinant $\Sigma \pm a_1 b_2 c_3 \geq 0$.

Vložíme-li do rovnice (3) za n jednu z hodnot kořenů n_1, n_2, n_3 rovnice (5), obdržíme příslušné *poměry* veličin α, β, γ .

Abychom usnadnili další kroky, položíme dle rovnic (3)

$$\begin{aligned}\alpha &= (b_2 c_3) - [b_2 + c_3]n + n^2, \\ \beta &= (c_2 a_3) + a_2 n, \\ \gamma &= (a_2 b_3) + a_3 n,\end{aligned}\quad (6)$$

kdež symbol $(b_2 c_3)$ značí determinant $b_2 c_3 - c_2 b_3$ a podobně ostatní.

Vložíme-li do těchto rovnic za n posloupně kořeny n_1, n_2, n_3 rovnice (5), obdržíme soustavy hodnot

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1; \alpha_2, \beta_2, \gamma_2; \alpha_3, \beta_3, \gamma_3.$$

Jsou-li kořeny n_1, n_2, n_3 vesměs reálné, budou i hodnoty, α, β, γ reálnými; jsou-li však dva kořeny na př. n_2, n_3 ideální, a je-li

$$n_2 = re^{i\varphi}, \text{ bude } n_3 = re^{-i\varphi},$$

načež vloživše tyto hodnoty do rovnic (6) shledáme ihned, že i

$$\alpha_2, \alpha_3, \beta_2, \beta_3, \gamma_2, \gamma_3$$

budou představovati spřezité neb konjugované hodnoty ideální.

Známe-li koeficienty α, β, γ , vložme je do rovnice (4), majíce zároveň na zřeteli rovnice (3), načež obdržíme

$$dt = \frac{\alpha_1 dx + \beta_1 dy + \gamma_1 dz}{n_1(\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z) + B_1}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\alpha_2 dx + \beta_2 dy + \gamma_2 dz}{n_2 (\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z) + B_2} \\
&= \frac{\alpha_3 dx + \beta_3 dy + \gamma_3 dz}{n_3 (\alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z) + B_3},
\end{aligned}$$

kdež ukazovatel u B oznamuje, že se takový má připojit k α , β , γ v B obsaženém.

Diferenciální rovnice tyto možná bezprostředně integrovati: povstaně tu

$$\frac{1}{n_1} l[n_1 (\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z) + B_1] = \frac{1}{n_2} lA[n_2 (\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z) + B_2],$$

aneb obrátíme-li

$$\frac{[n_1 (\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z) + B_1]^{n_2}}{[n_2 (\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z) + B_2]^{n_1}} = C_3.$$

Podobně bychom si mohli zjednotiti integrály ostatní, ač i jednoduchou kruhovou výměnou přípon se snadno obdrží.

Položíme-li tedy

$$\alpha_n x + \beta_n y + \gamma_n z = A_n,$$

objeví se co integrály

$$\begin{aligned}
F_1 &= \frac{(n_2 A_2 + B_2)^{n_3}}{(n_3 A_3 + B_3)^{n_2}} = C_1, \\
F_2 &= \frac{(n_3 A_3 + B_3)^{n_1}}{(n_1 A_1 + B_1)^{n_2}} = C_2, \\
F_3 &= \frac{(n_1 A_1 + B_1)^{n_2}}{(n_2 A_2 + B_2)^{n_1}} = C_3.
\end{aligned} \tag{7}$$

Jest tu patrné, že vždy jeden z těchto integrálů jest funkcí dvou ostatních, neb

$$F_1^{n_1} F_2^{n_2} F_3^{n_3} = 1.$$

Všeobecný integrál rovnice (1) jest tudíž

$$\Phi(F_1, F_2) = 0,$$

aneb nezrušíme-li souměrnost,

$$\Phi(F_1, F_2, F_3) = 0,$$

Jsou-li kořeny rovnice (5) vesměs *reálné*, jsou nalezené integrály F_1, F_2, F_3 též vesměs *reálné* funkce a úloha naše tudíž úplně řešena.

Má-li však rovnice (5) též kořeny *soujenné*, na př. n_2 a n_3 , obsahují též všechny tři funkce F_1, F_2, F_3 veličiny *imaginární*, pročež tu nastává otázka, kterak lze udati všeobecný integrál rovnice (1) ve formě *reálné*.

Abychom k této otázce stručnou dali odpověď, poukážeme přede vším k tomu, že pak hodnoty $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ a $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ jsou spřezíté č. konjugovaně imaginární, z čehož plyne, že i A_2, B_2 a A_3, B_3 , jakož i $n_2 A_2 + B_2$ a $n_3 A_3 + B_3$ budou spřezíté (při čemž arci jen reálné souřadnice x, y, z bere v úvahu).

Položíme-li tedy

$$\begin{aligned} n_2 A_2 + B_2 &= r e^{i\varphi}, \\ n_3 A_3 + B_3 &= r e^{-i\varphi}, \end{aligned}$$

kdež r a φ snadno lze ustanoviti, a tudíž

$$F_1 = \frac{r n_3 e^{i n_2 \varphi}}{r n_2 e^{-i n_3 \varphi}} = r n_3 \cdot n_2 e^{i(n_2 + n_3)\varphi} = C_1$$

jeden z integrálů (7). Nazveme-li však reálný součet všech tří kořenů rovnice (5) s , bude

$$n_3 + n_2 = s - n_1;$$

mimo to jest rozdíl dvou spřezitých veličin ryze imaginární, možná tedy položit

$$n_3 - n_2 = i v,$$

kdež v značí hodnotu reálnou. Tím se nám poslední vzorec promění v

$$F_1 = r i v e^{i(s-n_1)\varphi} = C_1$$

aneb v

$$F_1 = r v e^{i(s-n_1)\varphi} = c_1, \quad (8)$$

kdež c_1 jest opět veličina stálá, a povstane tudíž integrál rovnice (2) tvaru reálného.

Zcela obdobným způsobem lze ostatní dva integrály (7) uvést na formu reálnou; obdržít se tu snadno součin

$$F_2 F_3 = (n_1 A_1 + B_1)^{n_2 - n_3} \left(\frac{n_2 A_3 + B_3}{n_2 A_2 + B_2} \right)^{n_1} = C_2 C_3,$$

z čehož opět plyne, položíme-li

$$n_2 - n_3 = -i v \text{ atd.},$$

$$F_2 F_3 = (n_1 A_1 + B_1)^{-i v} e^{-i n_1 \varphi} = C_2 C_3,$$

aneb zkrátka

$$F_2 = (n_1 A_1 + B_1)^r e^{2 n_1 \varphi} = c_2, \quad (9)$$

v kterémžto druhém integrálu rovnice (2) jest c_2 integrační stálou.

Všeobecný integrál rovnice (1) jest pak

$$\Phi(F_1, F_2) = 0$$

a jest tudíž i co do tvaru reálný.

Při integraci předložené rovnice jsme předpokládali, že determinant

$$\Sigma \pm (a_1 b_2 c_3) \geq 0,$$

t. j. že nížádný z kořenů n_1, n_2, n_3 nerovná se 0.

Vezměme nyní i tento případ v úvahu a budiž tedy

$$\Sigma \pm a_1 b_2 c_3 = 0, \text{ tedy } n_1 = 0.$$

Jest patrné, že tím integrace, kterouž jsme obdrželi funkci F_1 , nikterak se neruší; neb tu jsme předpokládali, že $n_2 \geq 0$, a $n_3 \geq 0$. Jest tedy i nyní $F_1 = C_1$ jedním integrálem rovnic (2).

Pro ten případ, že by n_2, n_3 byly hodnoty ideální, bude

$$F_1 = r^v \exp = c_1$$

reálným integrálem.

Druhý integrál si však bezprostředně takto zjednáme.

Položme v rovnicích (3)

$$n = n_1 = 0,$$

načež obdržíme dle (4)

$$dt = \frac{\alpha_1 dx + \beta_1 dy + \gamma_1 dz}{B_1},$$

kdež můžeme položit

$$\alpha_1 = (b_2 c_3), \beta_1 = (c_2 a_3), \gamma_1 = (a_2 b_3),$$

načež bude, jak snadno lze poznati,

$$B_1 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 \end{vmatrix}.$$

Píšeme-li pak zkrátka α_0 místo $\frac{\alpha_1}{B_1}$ atd., bude

$$dt = \alpha_0 dx + \beta_0 dy + \gamma_0 dz = \frac{\alpha_2 dx + \beta_2 dy + \gamma_2 dz}{n_2 A_2 + B_2},$$

načež integrováním obdržíme druhý integrál rovnic (2), který se též snadno uvede na tvar reálný, kdyby n_2 bylo hodnoty ideální.

Ku konci budiž této právě vyvinuté metody upotřebeno k integrování rovnice s počátku položené a sice

$$(2y-3z) \frac{\partial z}{\partial x} + (2z-x) \frac{\partial z}{\partial y} = 3x-4y.$$

Zde jest patrně

$$\Sigma \pm a_1 b_2 c_3 = \begin{vmatrix} 0, & -2, & 3 \\ 2, & 0, & -4 \\ -3, & 4, & 0 \end{vmatrix}$$

a tudíž co protiměrný determinant stupně lichého s příčkou

prázdnou hodnoty 0, z čehož jde, že i $n_1 = 0$; pro druhé dva kořeny obdržíme pak $n_2 = i\sqrt{29}$, $n_3 = -i\sqrt{29}$.

Dále jest $a_4 = b_4 = c_4 = 0$, tedy i $B_1 = B_2 = B_3 = 0$, pročež tu platí

$$dt = \frac{\alpha_1 dx + \beta_1 dy + \gamma_1 dz}{B_1} = \frac{4dx + 3dy + 2dz}{0},$$

což vyžaduje, aby bylo

$$4dx + 3dy + 2dz = 0$$

aneb, integrujeme-li,

$$F_1 = 4x + 3y + 2z = C_1;$$

toť jest tedy první integrál rovnic (2) v tomto zvláštním případě.

Obdobně bude dále

$$dt = \frac{\alpha_2 dx + \beta_2 dy + \gamma_2 dz}{n_2 A_2} = \frac{\alpha_2 dx + \beta_3 dy + \gamma_3 dz}{n_3 A_3}$$

aneb, jelikož $n_2 = -n_3$,

$$\frac{\alpha_2 dx + \beta_2 dy + \gamma_2 dz}{A_2} + \frac{\alpha_3 dx + \beta_3 dy + \gamma_3 dz}{A_3} = 0,$$

z čehož jde integrováním

$$lA_2 + lA_3 = C \text{ neb } A_2 A_3 = C',$$

což jest druhým integrálem.

Uvážíme-li, že

$$\alpha_2 : \beta_2 : \gamma_2 = 13 : -(12 + i\sqrt{29}) : -(8 - 3i\sqrt{29})$$

$$\alpha_3 : \beta_3 : \gamma_3 = 13 : -(12 - i\sqrt{29}) : -(8 + 3i\sqrt{29}),$$

obdržíme místo posledního vzorce

$$A_2 A_3 = 13^2 x^2 + 260y^2 + 325z^2 - 24 \cdot 13xy \\ - 16 \cdot 13xz - 156yz = C',$$

z čehož jde, dělíme-li 13,

$$F_2 = 13x^2 + 20y^2 + 25z^2 - 24xy - 16xz - 12yz;$$

bude tedy též

$$F_1^2 + F_2 = 29(x^2 + y^2 + z^2) = C$$

integrálem rovnic (2).

Jest tudíž, jak s počátku již bylo ustanoveno,

$$\Phi(4x + 3y + 2z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

všeobecným integrálem předložené rovnice diferenciální.

Druhá cesta tato jest sice o něco delší nežli první, jest však za to všeobecnou.

II. Z fysiky.

Řešení úlohy 19.

(Podává *T. Havlíček*, žák VIII. tř. gymn. v Č. Budějovicích.)

Značí-li k koeficient boussoly na místě, kde se pozorování děje (či množství za minutu vyloučeného třaskavého plynu proudem, jenž jehlu odchyluje o 45°), mimo to W odpor galvanického řetězu a krátkých silných drátů spojujících řetěz s boussolou, E elektromotorickou sílu řetězu, úhel α pak odchyl, spojen-li řetěz galvanický s tangentním proudoměrem *přímo*, jest

$$\frac{E}{W} = k \operatorname{tg} \alpha,$$

a značí-li β odchyl po vložení 6' drátu měděného,

$$\frac{E}{W+6} = k \operatorname{tg} \beta,$$

béřeme-li totiž za míru odporu jednotku drátu měděného.

Vyloučíme-li tedy z obou rovnic E , obdržíme především

$$W = 6 \frac{\operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta} = 6 \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin (\alpha - \beta)},$$

a dosadíme-li hodnoty svrchu uvedené za α a β ,

$$W = 12'949.$$

Pomocí nabytého W najdeme pak snadno

$$E = 5'165 K.$$

Odpor řetězu jest tudíž 12'949krát větší nežli odpor jednotky drátu a síla elektromotorická jest 5'165krát větší nežli ona, která by při jedničce odporu jedničku proudu způsobila.

Úloha 27.

Aby loď nějaká za 1 h. urazila 7 angl. mil, jest zapotřebí 12 sil konských; jak musí býti tento počet zvýšen neb snížen, má-li uraziti za 1 h. mil a) 12, b) 5?