

# Aplikace matematiky

---

Petr Škoda; Jiří Neuberg

Algoritmy. 30. BRYAN. Bryanova metoda pro výpočet charakteristického polynomu matice

*Aplikace matematiky*, Vol. 18 (1973), No. 2, 137--139

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/103461>

## Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1973

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

30. BRYAN

BRYANOVA METODA PRO VÝPOČET CHARAKTERISTICKÉHO  
POLYNOMU MATICE

PETR ŠKODA, 120 00 Praha 2, Sokolská 29  
JIŘÍ NEUBERG, 100 00 Praha 10, 28. pluku 56

Bryanova metoda se používá pro výpočet koeficientů charakteristického polynomu matice. Ukažme v krátkosti postup.

Mějme reálné matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_m = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

kde  $1 \leq m \leq n$ . Předpokládejme, že známe charakteristický polynom  $\Phi_m(\lambda)$ , příslušný matici  $\mathbf{A}_m$ , řádu  $m$ . Zapišme  $\mathbf{A}_{m+1}$  ve tvaru:

$$\mathbf{A}_{m+1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_m & a_m \\ a_m^* & \alpha_m \end{pmatrix}$$

kde  $\alpha_m$  je číslo a  $a_m, a_m^*$  jsou vektory dimense  $m$ . Necht  $(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1})^A$  je adjungovaná matice k matici  $(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1})$ . Tedy platí:

$$(1) \quad (\lambda I - \mathbf{A}_{m+1})(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1}) = \det(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1}) I$$

Napišme nyní  $(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1})^A$  ve vroubeném tvaru.

$$(2) \quad (\lambda I - \mathbf{A}_{m+1})^A = \begin{pmatrix} F_m(\lambda), f(\lambda) \\ f_m^*(\lambda), \Phi_m(\lambda) \end{pmatrix},$$

kde  $f_m(\lambda)$  je vektor polynomů řádu nejvýše  $m - 1$ . Užitím vztahů (1) a (2) odvodíme rovnice:

$$(3) \quad (\lambda I - \mathbf{A}_m) f_m(\lambda) - a_m \Phi_m(\lambda) = 0$$

$$(4) \quad -a_m^* f_m(\lambda) + (\lambda - \alpha_m) \Phi_m(\lambda) = \Phi_{m+1}(\lambda),$$

kde z definice charakteristického polynomu máme  $\det(\lambda I - \mathbf{A}_{m+1}) = \Phi_{m+1}(\lambda)$ .  
Rovnici (3) je výhodné přepsat ještě na tvar

$$(3) \quad \lambda f_m(\lambda) = a_m \Phi_m(\lambda) + \mathbf{A}_m f_m(\lambda).$$

$\mathbf{A}_m$  a  $a_m$  jsou nezávislé na  $\lambda$ ,  $\Phi_m(\lambda)$  je stupně  $m$  a známý předem (v rekurenci  $\Phi_1(\lambda) = \lambda - a_{11}$ ), prvky  $f_m(\lambda)$  jsou polynomy stupně nejvýše  $m - 1$ . Odtud plyne, že porovnáním koeficientů u stejných mocnin  $\lambda$ , lze získat posloupnost vektorů koeficientů v  $f_m(\lambda)$ , počínaje koeficientem u  $\lambda^{m-1}$ , který je jednoduše  $a_m$ . Nalezneme-li tedy takto  $f_m(\lambda)$ , potom podle vztahu (4) lze určit  $\Phi_{m+1}(\lambda)$ .

Poznámka. Program byl vypracován v rámci cvičení z numerických metod pro posluchače 3. ročníku na matematicko-fyzikální fakultě v Praze.

**Procedure** BRYAN( $n, A, B$ );

**comment**  $n$ : řád matice  $A$

$A$ : matice, jejíž charakteristický polynom hledáme

$B$ : vektor koeficientů charakteristického polynomu  $B_1 \lambda^n + B_2 \lambda^{n-1} + \dots + B_n \lambda + B_{n+1}$ .

$C$ : pomocná matice, jejíž prvky jsou koeficienty u složek  $f(\lambda)$ ;

**integer**  $n$ ; **real array**  $A, B$ ;

**begin real array**  $C[1:n-1, 1:n-1]$ ;

**integer**  $i, j, k, m$ ; **real**  $s, v, r$ ;

$B[1] := 1$ ;  $B[2] := -A[1,1]$ ;

**for**  $m := 1$  **step** 1 **until**  $n - 1$  **do**

**begin for**  $i := 1$  **step** 1 **until**  $m$  **do**

$C[i, 1] := A[i, m+1] \times B[1]$ ;

**for**  $j := 2$  **step** 1 **until**  $m$  **do**

**for**  $i := 1$  **step** 1 **until**  $m$  **do**

**begin**  $s := 0$ ;

**for**  $k := 1$  **step** 1 **until**  $m$  **do**

$s := s + A[i, k] \times C[k, j-1]$ ;

$C[i, j] := A[i, m+1] \times B[j] + s$

**end**;

$s := B[2]$ ;  $B[2] := B[2] - A[m+1, m+1] \times B[1]$ ;  $B[m+2] := 0$ ;

**for**  $i := 3$  **step** 1 **until**  $m + 2$  **do**

**begin**  $v := 0$ ;

**for**  $k := 1$  **step** 1 **until**  $m$  **do**

$v := v + A[m+1, k] \times C[k, i-2]$ ;

$r := B[i]$ ;  $B[i] := B[i] - A[m+1, m+1] \times s - v$ ;

$s := r$

**end**

**end**

**end** BRYAN

Kontrolní příklady:

Pro matici

$$\begin{pmatrix} 1.00 & 0.42 & 0.54 & 0.66 \\ 0.42 & 1.00 & 0.32 & 0.44 \\ 0.54 & 0.32 & 1.00 & 0.22 \\ 0.66 & 0.44 & 0.22 & 1.00 \end{pmatrix}$$

dává metoda charakteristický polynom

$$f(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 4.752\lambda^2 - 2.111856\lambda + 0.286152,$$

pro matici

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

vychází charakteristický polynom

$$f(\lambda) = \lambda^4 - 18\lambda^3 + 97\lambda^2 - 180\lambda + 100$$

pro matici

$$\begin{pmatrix} 15 & 11 & 6 & -9 & -15 \\ 1 & 3 & 9 & -3 & -8 \\ 7 & 6 & 6 & -3 & -11 \\ 7 & 7 & 5 & -3 & -11 \\ 17 & 12 & 5 & -10 & -16 \end{pmatrix}$$

jsme obdrželi charakteristický polynom

$$f(\lambda) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 33\lambda^3 - 51\lambda^2 + 135\lambda + 225$$

#### Literatura

*A. S. Householder*: The Theory of matrices in Numerical analysis, 1965

*D. K. Faddějev, V. N. Faddějevová*: Numerické metody lineární algebry, 1964

*J. R. Westlake*: A Handbook of Numerical Matrix Inversion and Solution of Linear Equations.