

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Emil Weyr

O kuželosečkách a jich kruzích zakřivenosti

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 2 (1873), No. 1, 65--69

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/122445>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1873

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O kuželosečkách a jich kruzích zakřivenosti.

(Přednáška, kterouž prof. Dr. *Emil Weyr* dne 20. října 1872 započal novou činnost Jednoty českých matematiků.)

Pro veškeré úlohy, týkající se pouze vzájemného rozpoložení bodů téže křivky, osvědčuje se býti velmi výhodným upotřebením jediné proměnné veličiny — *parametru* —, jejímiž hodnotami pak jednotlivé body dotyčné křivky určeny jsou. Každá vlastnost křivky, týkající se pouze vzájemné polohy více bodů této křivky, vyjadřuje se pak jistou rovnicí, do kteréž vcházejí pak parametry oněch bodů.

Jest-li možná sříditi takovou souvislost hodnot parametru a příslušných bodů křivky, že každému bodu jen jediná hodnota parametru a naopak každé takovéto hodnotě jen jediný bod odpovídá, pak nazýváme křivku „*racionální*“.

Takové racionální křivky jsou i *kuželosečky*. Vrcholová rovnice kuželoseček pro souřadnice pravoúhlé zní, jak známo,

$$y^2 = 2px + qx^2 \quad (1)$$

a příslušná kuželosečka jest *ellipsou*, *parabolou* neb *hyperbolou* dle toho, jest-li $q \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} 0$.

Budiž u goniometrická tangenta úhlu, jež tvoří osa x s přímkou spojující bod (xy) kuželosečky s bodem počátečním t. j. budiž:

$$\frac{y}{x} = u \quad (2)$$

Poněvadž každá počátkem procházející přímka kuželosečku jen v jediném bodu protíná (mimo pevný vrchol) a poněvadž naopak každý bod kuželosečky jen jednou takovouto přímkou určuje a poněvadž konečně hodnotou u ona přímka a přímkou hodnota veličiny u úplně určena jest, tu soudíme, že hodnoty

poměru u určují *úplně a jednoznačně* (eindeutig, univocamente) body příslušné na kuželosečce. Veličina u jest tudíž parametr druhu výše vyznačeného a kuželosečky jsou tudíž skutečně křivky racionální.

Můžeme nyní krátce mluvit o bodu u naší křivky, čímž vyznámujeme onen bod křivky, jehož parametr $\left(\frac{y}{x}\right)$ má zvláštní hodnotu u .

Pravoúhlé souřadnice x, y bodu u vyjadřují se velmi jednoduše pomocí parametru u . Neb z (2) plyne $y = ux$, což vloženo do (1) nám dá:

$$\text{a dále: } \left. \begin{aligned} x &= \frac{2p}{u^2 - q} \\ x &= \frac{2pu}{u^2 - q} \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Souřadnice stanou se současně nekonečně velkými, jest-liže $u^2 = q$ aneb $u = \pm \sqrt{q}$. Nekonečně vzdálené body naší kuželosečky mají tedy parametry $+\sqrt{q}$ a $-\sqrt{q}$. Již z tohoto vychází na jevo, že křivka jest *hyperbolou*, je-li $q > 0$, poněvadž pak \sqrt{q} jest reálná a tedy i oba nekonečně vzdálené body. Obdobně plyne, že pro $q < 0$ máme *ellipsu* a pro $q = 0$ *parabolu*.

Abychom mohli určití též parametry vrcholů, sestrojme sobě nejdříve výraz pro směrnici přímky spojující dva body kuželosečky u_1, u_2 .

Je-li β úhel přímky $\overline{u_1 u_2}$ s osou x , tu máme, jak známo,

$$tg\beta = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{\frac{u_1}{u_1^2 - q} - \frac{u_2}{u_2^2 - q}}{\frac{1}{u_1^2 - q} - \frac{1}{u_2^2 - q}}$$

aneb po snadné redukci,

$$tg\beta = \frac{u_1 u_2 + q}{u_1 + u_2} \quad (4)$$

Z tohoto vzorce plyne, že přímka $\overline{u_1 u_2}$ rovnoběžnou bude s osou x , jest-liže

$$u_1 u_2 + q = 0,$$

a rovnoběžnou s osou y , je-li:

$$u_1 + u_2 = 0.$$

Jsou-li u_1, u_2, u_3 tři body naší kuželosečky a jest-li $\overline{u_1 u_3}$ // k ose x a $\overline{u_2 u_3}$ // k ose y , pak body u_1, u_2 jsou body protilehlé, t. j. $\overline{u_1 u_2}$ jest průměrem naší křivky.

Máme pro tento případ rovnice:

$$\begin{aligned} u_1 u_3 + q &= 0, \\ u_2 + u_3 &= 0, \end{aligned}$$

z čehož ihned plyne:

$$u_1 u_2 = q$$

co podmínka, by body u_1, u_2 byly body protilehlými.

Z rovnice (4) plyne směrnice $tg\alpha$ pro tečnu bodu u , učiníme-li $u_2 = u_1 = u$, což nám dá:

$$tg\alpha = \frac{u^2 + q}{2u}, \quad (5)$$

Směrnice asymptot obdržíme, vložíme-li do tohoto vzorce $u = \pm \sqrt{q}$, což nám dá $tg\alpha = \pm \sqrt{q}$.

Spojíme-li kuželosečku s libovolným kruhem

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + m^2 = 0, \quad (6)$$

kde

$$m^2 = \alpha^2 + \beta^2 - r^2,$$

a chceme-li určit parametry u_1, u_2, u_3, u_4 čtyř bodů, v nichž kruh kuželosečku protíná, tu vložíme hodnoty z (3) do rovnice kruhu (6), čímž po snadném zjednodušení obdržíme biquadratickou rovnici:

$$\begin{aligned} m^2 u^4 - 4\beta p u^3 + (4p^2 - 4\alpha p - 2m^2 q) u^2 + 4\beta p q u \\ + (4p^2 + 4\alpha p q + m^2 q^2) = 0. \end{aligned}$$

Kořeny této rovnice jsou parametry průseků kruhu a kuželosečky. Poněvadž kruh jest třemi body úplně určen, nechá se očekávat, že mezi hodnotami u_1, u_2, u_3, u_4 řečených parametrů bude stávatí takové souvislosti, že každá z nich ostatními třemi úplně určena bude.

Připomeneme-li si známou souvislost kořenů a činitelů rovnic, shledáme z poslední rovnice, že

$$(u)_1 = \frac{4\beta p}{m^2}, \quad (u)_3 = -\frac{4\beta p q}{m^2},$$

tak že tedy

$$(u)_3 + q(u)_1 = 0, \quad (7)$$

při čemž

$$\begin{aligned} (u)_1 &= u_1 + u_2 + u_3 + u_4, \\ (u)_3 &= u_1 u_2 u_3 + u_1 u_2 u_4 + u_1 u_3 u_4 + u_2 u_3 u_4. \end{aligned}$$

Rovnice (7) vyjadřuje souvislost, o které jsme se dříve zmínili a která nám dovoluje určití jednoduchým způsobem jeden z čtyř bodů $u_1 u_2 u_3 u_4$, známe-li ostatní tři. Rovnici (7) lze považovati za podmínku, by čtyry body $u_1 u_2 u_3 u_4$ naší kuželosečky na tomtéž kruhu se nalezaly.

Zajímavé jest upotřebení rovnice (7) k důkazu věty o kruzích zakřivenosti, vyřknuté slavným *Steinerem* (viz Crelle sv. . . .) a dokázané analytickým způsobem (však jen pro ellipsu) slovatným matematikem *Joachimsthaelem* (viz Crelle sv. . . .) jakož i geometrický p. *Augustem* (ibid. sv. . . .). Rovnice (7) nám dovoluje následující pro kuželosečky vůbec platnost mající větu dokázati.

„Každým bodem kuželosečky procházejí tři kruhy zakřivenosti, které se dotýkají kuželosečky v třech bodech nalezajících se s původním bodem na obvodu téhož kruhu.“

Budiž u_4 libovolný bod kuželosečky, kterým prokládáme kruhy zakřivenosti. Jest-li u bod, v němž se takovýto kruh kuželosečky dotýká, tu mezi u_4 a u stává relace, kterou obdržíme z rovnice (7), položíme-li $u_1 = u_2 = u_3 = u$. Tu jest především

$$\begin{aligned}(u)_1 &= 3u + u_4, \\ (u)_2 &= u^3 + 3u^2 u_4\end{aligned}$$

a rovnice (7) přejde tudíž v následující:

$$u^3 + 3u^2 u_4 + 3uq + u_4 q = 0 \quad (8)$$

Rovnice tato jsouc stupně třetího nám praví, že každým bodem (u_4) procházejí tři kruhy zakřivenosti, (mimo kruh zakřivenosti, který se v tomto bodu u_4 dotýká), jejichž body styku mají kořeny rovnice (8) za parametry.

Označíme-li tyto kořeny $u_1 u_2 u_3$, tu plyne z rovnice (8) bezprostředně:

$$\begin{aligned}u_1 + u_2 + u_3 &= -3u_4, \\ u_1 u_2 + u_1 u_3 + u_2 u_3 &= 3q, \\ u_1 u_2 u_3 &= -qu_4;\end{aligned}$$

z prvních dvou rovnic dále plyne

$$\begin{aligned}u_1 + u_2 + u_3 + u_4 &= -2u_4, \\ u_1 u_2 u_4 + u_1 u_3 u_4 + u_2 u_3 u_4 &= 3qu_4.\end{aligned}$$

Přičteme-li rovnici $u_1 u_2 u_3 = -qu_4$ k poslední, obdržíme

$$(u)_3 = 2qu_4$$

a poněvadž

$$q(u)_1 = -2qu_4$$

máme konečně

$$(u)_3 + q(u)_1 = 0$$

z čehož dle (7) soudíme, že body u_4, u_1, u_2, u_3 skutečně na tom-těž kruhu se nacházejí, jak dokázati jsme chtěli.

Při jiné příležitosti ukážeme, jak výhodně lze parametrů (u) k řešení jiných rozmanitých o kuželosečkách jednajících úloh použítí.

Geometrické upotřebení některých pouček o determinantech.

(Sepsal Prof. Dr. F. J. Studnička.)

Kdo se chce vycvičiti v užívání základních pouček o determinantech platících, nenalezne snad vděčnějšího pole nad analytickou geometrii jak v rovině tak v prostoru. Neb tu vyskytuje se stále řešení rovnic, vylučování rozličných veličin jakož i přetvořování výrazů, samé to úlohy, kteréž, jak známo z dějin theorie determinantů, první podnět daly k jejímu vyvinutí.

A jelikož nyní již na lepších školách středních možná si zjednati nejprvnějších známostí determinantů, sestavil jsem tuto analytický rozbor trojúhelníku a čtyřstěnu, abych ukázal, jak prospěšně se tu používá některých jednoduchých vlastností těchto zajímavých výrazů kombinatorických, doufaje, že mnohý tím bude povzbuzen k dalšímu studiu v oboru tomto.

I. O trojúhelníku.

Nejjednodušším způsobem určí se analytický trojúhelník v rovině, ustanoví-li se buď pravoúhelné souřadnice jeho vrcholů neb rovnice jeho stran, načež se snadno vypočítá obsah jeho, určí délka stran a výšek jakož i velikost uhlů jeho.

Značí-li v případě prvním x_k, y_k souřadnice bodu B_k , bude plocha trojúhelníku $B_1 B_2 B_3$ — obr. 7. — patrně

$$P = (I + II + III) - (I) - (II);$$