

Matematicko-fyzikálny časopis

Ján Jakubík

O reťazcoch v Boolových algebrách

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 8 (1958), No. 4, 193--202

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126696>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1958

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O REŤAZCOCH V BOOLOVÝCH ALGEBRÁCH

JÁN JAKUBÍK, Košice

Pripomeňme najprv niektoré názvy a označenia, ktoré ďalej používame. Nech S je sväz (čiastočné usporiadanie a sväzové operácie v S označujeme \leq, \cap, \cup). Ak $a, b \in S$, $a < b$, označíme znakom $R(a, b)$ (prípadne s indexmi) reťazec vo sväze S , majúci najmenší prvok a a najväčší prvok b . Hovoríme, že reťazec $R(a, b)$ je maximálny, keď platí: ak je prvok $c \in S$ porovnateľný so všetkými prvkami reťazca $R(a, b)$ a ak je $a < c < b$, potom $c \in R(a, b)$.

Budeme vyšetrovať nasledujúcu (tzv. Jordan—Dedekindovu) podmienku pre sväz S :

(JD) Ak $a, b \in S$, $a < b$ a ak $R_1(a, b)$, $R_2(a, b)$ sú maximálne reťazce, sú kardinálne čísla množín $R_1(a, b)$, $R_2(a, b)$ rovnaké.

Je známe, že konečné distributívne sväzy spĺňujú podmienku (JD) (pozri [1]). R. Croisot a G. Szász dokázali, že podmienka (JD) je splnená aj v semimodulárnych sväzoach, v ktorých každý ohraničený reťazec je konečný ([2], [3]). Ak existujú ohraničené nekonečné reťazce v S , je situácia podstatne odlišná: v práci [4] uviedol G. Szász príklad nekonečného distributívneho sväzu, nespĺňujúceho podmienku (JD); v práci [5] sa dokazuje existencia úplne distributívnych úplných sväzov, ktoré nespĺňujú podmienku (JD) a v poznámke [6] je dokázané, že žiadna úplne distributívna a úplná Boolova algebra nespĺňuje podmienku (JD). Určitá podmienka, blízka podmienke (JD), vyšetruje sa v práci G. Grätzera a E. T. Schmidta [7]; ich podmienka sa týka tiež „medzier“ v reťazci R a pritom pojem maximálnosti definujú iným spôsobom, ako bolo uvedené vyššie.

Táto poznámka nadväzuje na článok [5] a jej cieľom je dokázať pre Boolove algebry tvrdenie do istej miery analogické tvrdeniu vety dokázanej v [5] pre distributívne sväzy.

Nech S_1 je sväz, ktorý má najmenší prvok 0 a najväčší prvok 1 ($0 \neq 1$), nech $R = R(0, 1)$ je maximálny reťazec v S_1 . Predpokladajme, že reťazec R je v sebe hustý, t. j. že platí: ak $x, y \in R$, $x < y$, existuje prvok $z \in R$ taký, že $x < z < y$. Nech M je ľubovoľná neprázdna množina. Nech $S(M)$ je množina všetkých funkcií definovaných na M , ktorých funkčné hodnoty patria do S_1 . Množinu $S(M)$ považujeme za čiastočne usporiadanú reláciou \leq tak,

e kladieme $f \leq g$ ($f, g \in S(M)$), ak je pre každé $x \in M$ $f(x) \leq g(x)$. Potom $S(M)$ je sváz.

Nech $x \in S_1$. Funkciu $f \in S(M)$ splňujúcu podmienku

$$i \in m \Rightarrow f(i) = x$$

označme f_x .

Nasledujúce lemmy 1, 2, 3 sú zovšeobecnením lemm 1, 2, 6 článku [5].

Lemma 1. *Nech $R_1 = \{f_x, x \in R\}$. Potom R_1 je maximálny reťazec v $S(M)$ (a má za najmenší, resp. najväčší prvok funkcie f_0 , resp. f_1).*

Dôkaz. Zrejme platí $f_0, f_1 \in R_1$ a R_1 je reťazec. Nech $f \in S(M)$, $f \in R_1$. Rozlišujeme dva prípady. a) Existuje prvok $i \in M$ taký, že $f(i) \notin R$. Z maximálnosti reťazca R vyplýva existencia prvku $x \in R$, neporovnateľného s prvkom $f(i)$. Prvky f_x , f svázu $S(M)$ sú neporovnateľné. b) Predpokladajme, že pre každé $i \in M$ $f(i) \in R$. Keďže $f \notin R_1$, existujú prvky $i, j \in M$ také, že $f(i) < f(j)$. Reťazec R je v sebe hustý, teda existuje $x \in R$, $f(i) < x < f(j)$. Prvky f, f_x sú potom neporovnateľné. Tým je tvrdenie dokázané.

V ďalšej úvahe považujeme za splnenú axiómu výberu. Predpokladajme, že množina M je dobre usporiadaná a že v tomto usporiadaní M má najväčší prvok. Nech pre každé $i \in M$ R^i je množina všetkých funkcií $f \in S(M)$, pre ktoré platí: ak $j \in M$, potom

$$j < i \Rightarrow f(j) = 1, \quad j \geq i \Rightarrow f(j) = 0, \quad f(i) \in R. \quad (1)$$

Poznámka. Zrejme každá množina R^i má najmenší a najväčší prvok — e maximálnym reťazcom. Označme $R_2 = \cup R^i$ ($i \in M$).

Lemma 2. *R_2 je maximálny reťazec v $S(M)$.*

Dôkaz. Zrejme je $f_0 \in R_2$ a R_2 je reťazec. Keďže M má najväčší prvok, platí tiež $f_1 \in R_2$. Nech prvok $g \in S(M)$ je porovnateľný so všetkými prvkami $f \in R_2$. Dokážeme, že potom $g \in R_2$. a) Predpokladajme, že existuje prvok $i \in M$, taký, že $g(i) \notin R$. Rovnako ako v lemme 1 sa dokáže existencia prvku $f \in R_2$, neporovnateľného s prvkom g . b) Predpokladajme, že pre každé $i \in M$ platí $g(i) \in R$. Ak existuje prvok $i \in M$ taký, že $g(i) \neq 0$, $g(i) \neq 1$, existujú prvky $f, f' \in R^i$ také, že $f(i) < g(i) < f'(i)$. Keďže prvky f, f', g sú podľa predpokladu porovnateľné, platí $f < g < f'$, teda podľa poznámky za lemmou 1 $g \in R^i$.

Ak je pre všetky $i \in M$ $g(i) = 0$ alebo $g(i) = 1$, nech M_1 je množina všetkých $i \in M$, pre ktoré $g(i) = 0$. Množina M_1 je neprázdna, keďže $g \neq f_1$. Nech i_0 je najmenší prvok množiny M_1 . Pre $j > i_0$ existuje $f \in R^j$, $f(i_0) = 1$, $f(j) = 0$. Keďže prvky f, g sú porovnateľné a keďže $g(i_0) = 0$, musí $g(j) = 0$. Platí teda pre každé $j \in M$

$$j < i_0 \Rightarrow g(j) = 1, \quad j \geq i_0 \Rightarrow g(j) = 0,$$

takže podľa (1) $g \in R_2$.

Poznámka. Všimnime si ďalej, že kardinálne číslo reťazca R_1 je rovné

kardinálnemu číslu reťazca R a kardinálne číslo reťazca R_2 je rovné maximu z kardinálnych čísel množín R , M (keďže reťazec R je nekonečný).

Lemma 3. *Nech M_1, M_2 sú množiny, $M_1 \neq \emptyset \neq M_2$, $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, $M_1 \cup M_2 = M$. Potom sväzy $S(M)$ a $S(M_1) \times S(M_2)$ sú izomorfné.*

Dôkaz je zrejmy. (Porov. aj [1], str. 8 (6); tam ide o izotónne funkcie.)

Lemma 4. *Nech A, B, S sú sväzy, ktorých najmenšie, resp. najväčšie prvky sú $0_A, 0_B, 0_S$, resp. $1_A, 1_B, 1_S$. Nech sväzy $S, A \times B$ sú izomorfné. Nech vo sväze $A(B)$ existuje maximálny reťazec $R_1(0_A, 1_A)(R_2(0_B, 1_B))$ s kardinálnym číslom $k_1(k_2)$, pričom k_1, k_2 sú nekonečné kardinálne čísla. Potom v sväze S existuje reťazec $R(0_S, 1_S)$, ktorého kardinálne číslo je $\max(k_1, k_2)$.*

Dôkaz. Množina $A_1 \subset A \times B, A_1 = \{(a, 0_B), a \in A\}$ je izomorfná so sväzom A , teda v nej existuje maximálny reťazec R'_1 s najmenším prvkom $(0_A, 0_B)$ a najväčším $(1_A, 0_B)$, ktorého kardinálne číslo je k_1 . Analogicky je množina $B_1 \subset A \times B, B_1 = \{(1_A, b), b \in B\}$ izomorfná so sväzom B , teda v nej existuje maximálny reťazec R'_2 s najmenším prvkom $(1_A, 0_B)$ a najväčším $(1_A, 1_B)$, pričom R'_2 má kardinálne číslo k_2 . Množina $R'_1 \cup R'_2$ je potom maximálny reťazec vo sväze $A \times B$: tento reťazec má najmenší prvok $(0_A, 0_B)$ a najväčší $(1_A, 1_B)$. Reťazcu $R'_1 \cup R'_2$ zodpovedá vo vyšetrovanom izomorfizme vo sväze S zrejme maximálny reťazec s najmenším prvkom 0_S a s najväčším 1_S a s kardinálnym číslom $k_1 + k_2 = \max(k_1, k_2)$.

Nech S_0 je Boolova algebra všetkých podmnožín spočítateľnej množiny A , nech J je ideál v S_0 , tvorený všetkými konečnými podmnožinami množiny A a nech S_1 je faktorová Boolova algebra, vytvorená ideálom J na S_0 . Najmenší, resp. najväčší prvok v S_1 označme 0 , resp. 1 .

Vo sväze S_1 neexistuje žiaden prvointerval. (Ak je totiž $a, b \in S_1, a < b$, existujú množiny $a, b \in S_0, a \in \bar{a}, b \in \bar{b}, a \subset b$ také, že množina $b - a$ je nekonečná; tedy existuje množina $c \in S_0, a \subset c \subset b$, pričom množiny $b - c, c - a$ sú nekonečné. Ak \bar{c} je trieda v S_1 , obsahujúca množinu c , platí $\bar{a} < \bar{c} < \bar{b}$).

Nech $R = R(0, 1)$ je ľubovoľný (pevne vybraný) maximálny reťazec v S_1 . Podľa predošlého reťazec R je v sebe hustý. Nech k je kardinálne číslo reťazca R . (Platí zrejme $k \leq 2^{\aleph_0}$.)

Veta. *Nech α je kardinálne číslo, $\alpha \geq k$. Existuje Boolova algebra B_α (ktorej najmenší, resp. najväčší prvok označíme f_0 , resp. f_1), pre ktorú platí: ku každému kardinálnemu číslu $\beta, k \leq \beta \leq \alpha$, existuje v B_α maximálny reťazec $R_\beta(f_0, f_1)$, ktorého kardinálne číslo je β .*

Dôkaz. Nech M je množina, ktorej kardinálne číslo je α . Označme (v terminológii, zavedenej pred lemmou 1, pričom $S_1 = S_0/J$, ako sme uviedli) $S(M) = B_\alpha$. Vyjadrieme množinu M v tvare $M = M_1 \cup M_2, M_1 \cap M_2 = \emptyset$, pričom $\text{kard } M_1 = \beta, \text{kard } M_2 = \alpha$. Označme $S(M_1) = A, S(M_2) = B$; najmenší, resp. najväčší prvok v sväze $A(B)$ označme rovnako ako v lemme 4.

Podľa lemmy 2 v sväze A existuje maximálny reťazec $R_1(0_A, 1_A)$ o kardinálnom čísle β , a podľa lemmy 1 existuje v sväze B maximálny reťazec

$R_2(0_B, 1_B)$ o kardinálnom čísle k . Podľa lemy 3 a 4 v sväze $S(M)$ existuje reťazec $R_\beta(f_0, f_1)$, ktorého kardinálne číslo je β .

Poznámka. Pri dôkaze lemy 1 sme predpokladali, že reťazec R je v sebe hustý. Tento predpoklad je podstatný; bez neho by tvrdenie lemy 1 nemuselo platiť.¹ Presnejšie povedané: ak M obsahuje viac ako jeden prvok a ak reťazec R nie je v sebe hustý (t. j. obsahuje ako podmnožinu prvointerval), reťazec R_1 , zostrojený v dôkaze lemy 1, nie je maximálny. Ak je totiž $a, b \in R$ a ak je prvok a pokrytý prvkom b , rozdelíme množinu M na dve neprázdne navzájom disjunktné podmnožiny M_1, M_2 a utvoríme $g \in S(M)$ tak, že položíme $g(i) = a$ pre $i \in M_1, g(i) = b$ pre $i \in M_2$. Potom $f_a < g < f_b, g \notin R_1$ a funkcia g je zrejme porovnateľná s každou funkciou reťazca R_1 .

Nasledujúce lemy môžu prispieť k riešeniu otázky: aké poradové typy maximálnych reťazcov sa vyskytujú v danej Boolovej algebre.

Lemma 5. *Nech je S_2 ľubovoľná Boolova algebra, ktorá obsahuje aspoň dva prvky a v ktorej neexistuje žiadny prvok pokrývajúci prvok 0 (t. j. neexistuje žiadny atóm). Nech $R = R(0, 1)$ je maximálny reťazec v S_2 . Reťazec R je v sebe hustý.*

Dôkaz. Predpokladajme, že $a, b \in R, a < b$. Nech a_1 je relatívny komplement prvku a v intervale $\langle 0, b \rangle$. Ak je $a = 0$, podľa predpokladu b nie je atóm v S , teda existuje $c \in S, a < c < b$. Ak $a \neq 0$, potom $0 < a_1 < b$. Existuje prvok $c_1, 0 < c_1 < a_1$. Označme $a \cup c_1 = c$. Z predošlého vyplýva $a < c < b$. Teda prvok a nie je pokrytý prvkom b .

Z lemy 5 vyplýva, že vo vyššie dokázanej vete by sme mohli vziať za východisko úvahy namiesto tam použitej Boolovej algebry S_1 ľubovoľnú Boolovu algebru, ktorá neobsahuje žiadny atóm a ktorá má viac ako jeden prvok. (Význam znaku k by sa potom, prirodzene, zmenil.)

Pre úplnú Boolovu algebru platí tiež obrátenie lemy 5.

Lemma 5'. *Nech v úplnej Boolovej algebre S existuje atóm. Potom každý maximálny reťazec $R(0, 1)$ v S obsahuje prvointerval.*

Dôkaz. Nech sú splnené predpoklady lemy, nech a je atóm v S . Prípád $a = 1$ je triviálny. Označme

$$A = \{x \in R, x \cap a = 0\}, \quad B = \{x \in R, x \cap a \neq 0\}.$$

Každá z množín A, B je neprázdna, keďže $0 \in A, 1 \in B$. Nech a' je komplement prvku a . Pre $x \in A$ platí $x = (x \cap a) \cup (x \cap a') = x \cap a', x \leq a'$, a pre $x \in B$ je $x \geq a$. Označme

$$a_1 = \sup A, \quad a_2 = \inf B.$$

Keďže R je maximálny reťazec, musí byť $a_1, a_2 \in R$; ďalej je $a_1 \leq a', a \leq a_2$, takže musí byť tiež $a_1 < a_2$. Ak by existoval prvok $c \in S, a_1 < c < a_2$, muselo by platiť $c \in R(0, 1), c \in A, c \in B$, čo je spor, a dôkaz je ukončený.

¹ Na túto okolnosť ma upozornil prof. Jerzy Łoś.

Z postupu dôkazu sa ľahko zistí, že prvointervaly $\langle 0, a \rangle$, $\langle a_1, a_2 \rangle$ sú projektívne (dokonce transponované). Nech M je množina všetkých atómov úplnej Boolovej algebry S , nech $R(0, 1)$ je maximálny reťazec v S . Každému atómu $m \in M$ je podľa predošlej lemy priradený prvointerval

$$m \rightarrow \langle a_1^m, a_2^m \rangle \subset R(0, 1).$$

Ak by dvom rôznym atómom $m_1, m_2 \in M$ bol týmto spôsobom priradený ten istý prvointerval reťazca $R(0, 1)$, podľa predošlého boli by prvointervaly $\langle 0, m_1 \rangle, \langle 0, m_2 \rangle$ navzájom projektívne, čo však nie je možné. Tým sme dokázali nasledujúcu lemmu:

Lemma 5''. *Nech M je množina všetkých atómov úplnej Boolovej algebry S , nech $R(0, 1)$ je maximálny reťazec v S a nech M_1 je množina všetkých prvointervalov reťazca $R(0, 1)$. Potom platí*

$$\text{kard } M \leq \text{kard } M_1.$$

Ak by sme do lemy 5' namiesto výrazu „v úplnej Boolovej algebri“ položili výraz „v úplnom distributívnom sväze“, dostali by sme nesprávne tvrdenie. Dokážeme to na nasledujúcom príklade:

Príklad 1. Nech $S_1 = \{0, a\}$, $a > 0$. $S_2 = \langle 0, 1 \rangle$ (interval reálnych čísel s obvyklým usporiadaním), $S_3 = S_1 \times S_2$, $S = S_3 \cup \{1\}$ pričom pre prvky $x, y \in S_3$ ostáva v S rovnaké čiastočné usporiadanie ako v S_3 a pre každé $x \in S_3$ kladieme $x < 1$. Zrejme je S úplný distributívny sväz. Vo sväze S existuje prvointerval (tvorený prvkami $(0, 0)$ a $(a, 0)$ a pritom množina

$$R = \{(0, x), x \in \langle 0, 1 \rangle\} \cup \{1\}$$

je maximálny reťazec v S , v ktorom leží najmenší i najväčší prvok sväzu S a ktorý neobsahuje prvointerval.

V lemme 5' nemôžeme vynechať predpoklad o úplnosti Boolovej algebry S :

Príklad 2. Nech S_2 je ľubovoľná Boolova algebra, pre ktorú platí:

- v S_2 neexistuje atóm,
- v S_2 existuje maximálny reťazec R_2 , obsahujúci najmenší i najväčší prvok sväzu S_2 , a reťazec R_2 nie je úplný.²

Podľa lemy 5 reťazec R_2 je v sebe hustý. Podľa predpokladu sa dá reťazec R_2 rozložiť na súčet dvoch neprázdnych disjunktných podmnožín A, B tak, že pre každé $x \in A, y \in B$ platí $x < y$, pričom v množine A neexistuje najväčší prvok a v množine B neexistuje najmenší prvok. Nech S_1 má rovnaký význam ako v príklade 1. Označme $S = S_1 \times S_2$; S je Boolova algebra obsahujúca atóm $(a, 0)$. Nech

$$R = \{(0, x), x \in A\} \cup \{(a, x), x \in B\}.$$

Ľahko sa preverí, že R je maximálny reťazec v S , obsahujúci najmenší i naj-

² T. j. R_2 nie je úplný sväz.

väčší prvok sväzu S . Ďalej je reťazec R_2 izomorfný s reťazcom R , teda podľa lemy 5 v reťazci R neexistuje prvointerval.

Zostáva ešte otázka, či existuje Boolova algebra S , ktorá by mala vlastnosti a), b), uvedené v príklade 2. Dokážeme najprv, že platí:

Lemma 6. *Nech S je sväz, ktorý má najmenší prvok 0 a najväčší 1. Ak sväz S nie je úplný, potom existuje maximálny reťazec $R(0, 1)$ v S , ktorý nie je úplný.*

Dôkaz. Nech sú splnené predpoklady lemy, nech sväz S nie je úplný. Potom existujú množiny $A, B \subset S$ také, že $A(B)$ je množina všetkých dolných (horných) ohraničení množiny $B(A)$ a pritom v množine $A(B)$ neexistuje najväčší (najmenší) prvok. Vnorme sväz S do úplného sväzu S' pomocou konštrukcie, opísanej v [1], str. 58–59 („Dedekindove rezy“). V sväze S' existuje prvok x' taký, že platí

$$\begin{aligned} \sup A = x' = \inf B, \\ x \in S, \quad x < x'(x > x') \Rightarrow x \in A(x \in B). \end{aligned}$$

Uvažujme čiastočne usporiadanú množinu $P = S \cup \{x'\}$ (s čiastočným usporiadaním ako v S'). Podľa [1], kap. III, § 6 v P existuje maximálny reťazec R , obsahujúci prvky $0, x', 1$. Ľahko sa preverí, že množina $R = R - \{x'\}$ je maximálny reťazec v S a že tento reťazec nie je úplný.

Teraz zostrojíme:

Príklad 3. Nech M je množina všetkých dvojíc (x, y) reálnych čísel, pre ktoré $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. Nech S_1 je systém všetkých podmnožín množiny M , ktoré sú alebo najviac spočítateľné, alebo ktorých komplement je najviac spočítateľný. S_1 je Boolova algebra. Nech J je ideál v S_1 , tvorený všetkými konečnými podmnožinami množiny M . Označme $S_2 = S_1/J$. Triedu v S_2 , obsahujúcu prvok $z \in S_1$, označíme z . Ľahko sa zistí, že v S_2 neexistuje atóm.

Ak $z_1, z_2 \in S_1$, potom zrejme platí

$$\overline{z_1} \leq \overline{z_2} \Leftrightarrow z_1 - z_2 \in J. \quad (2)$$

Nech Y je spočítateľná množina, $Y \subset \langle 0, 1 \rangle$. Nech pre $x \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle a(x) = \{(x, y) \mid y \in Y\}$, $A = \left\{ \overline{a(x)}, x \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle \right\}$.

Predpokladajme, že by S_2 bola úplná Boolova algebra. Potom by množina $A \subset S_2$ mala supremum v S_2 :

$$s = \cup \overline{a(x)}. \quad (3)$$

Nech $a \in S_1, a \in s$. Podľa (3) a (2) platí pre každé $x \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle$

$$a(x) - a \in J,$$

teda $a(x) \cap a \neq \emptyset$. Keďže pre $x_1, x_2 \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle, x_1 \neq x_2$ platí $a(x_1) \cap a(x_2) = \emptyset$,

množina a je nespočítateľná. Z toho vyplýva, že jej komplement a' je najviac spočítateľný. Teda existuje spočítateľná množina $b \subset c = \langle \frac{1}{2}, 1 \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ taká, že $b \subset a$,³ a teda tiež $b \cap a = b$, $0 < \bar{b} < \bar{a}$ (znakom 0 tu označujeme najmenší prvok v S_2).

Pre každé $x \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle$ platí $b \cap a(x) = \emptyset$, $\bar{b} \cap \bar{a}(x) = 0$; z nekonečnej distributívnosti (porov. [1], str. 165) dostávame

$$\bar{b} \cap a = \bar{b} \cap (\cup \bar{a}(x)) = \cup (\bar{b} \cap \bar{a}(x)) = 0.$$

Tým sme došli ku sporu. Teda sväz S_2 nie je úplný.

Podľa lemy 6 sväz S_2 splňuje podmienku b), uvedenú v príklade 2.

Poznámka. Existencia Boolovej algebry s vlastnosťami a), b) z predošlého príkladu 2 vyplýva tiež z výsledkov práce [10] (porovnaj hlavne pozn.¹¹) pri použití lemy 6.

Poznámka. Nech $\langle a, b \rangle$, $\langle c, d \rangle$ sú intervaly distributívneho sväzu S , $b \geq c$, $a \neq b$, $c \neq d$. Potom intervaly $\langle a, b \rangle$, $\langle c, d \rangle$ nemôžu byť projektívne. (Ak by totiž tieto intervaly boli projektívne, existovali by podľa [1], kap. IX, § 13. Ex. 4a prvky $u, v \in S$ také, že by platilo

$$c = (a \cup u) \cap v, \quad d = (b \cup u) \cap v.$$

Z toho vyplýva $v \geq d$, takže $v \geq a$, $v \geq b$ a z distributívnosti dostávame

$$c = a \cup (u \cap v), \quad d = b \cup (u \cap v).$$

Podľa prvej z predošlých rovností je $u \cap v \leq c$, teda $b \cup (u \cap v) \leq c$, čím sme došli ku sporu.)

Lemma 7. *Nech $R(0, 1)$ je maximálny refazec v Boolovej algebre S , nech znaky M_1, M majú rovnaký význam ako v lemme 5". Potom*

$$\text{card } M_1 \leq \text{card } M.$$

Dôkaz. Nech $p = \langle a, b \rangle$ je ľubovoľný prvointerval refazca $R(0, 1)$. Nech a' je komplement prvku a . Potom prvok $c = b \cap a'$ je atóm, keďže intervaly $\langle 0, c \rangle$, $\langle a, b \rangle$ sú transponované. Priradenie

$$p \rightarrow c \tag{4}$$

zobrazuje množinu M_1 do množiny M . Ak $p, p' \in M_1$ a ak je v uvažovanom priradení

$$p \rightarrow c, \quad p' \rightarrow c,$$

potom sú podľa predošlého prvointervalu p, p' navzájom projektívne, takže podľa predchádzajúcej poznámky $p = p'$. Z toho vyplýva, že zobrazenie je prosté. Tým je tvrdenie dokázané.

³ Keďže a' je najviac spočítateľná množina, musí byť aj $a' \cap c$ najviac spočítateľná množina, teda $a \cap c$ je nespočítateľná množina.

Z lemy 5" a 7 vyplýva

Lemma 8. *Nech $R(0, 1)$ je maximálny reťazec v úplnej Boolovej algebre S . Nech znaky M_1, M majú rovnaký význam ako v lemme 5". Potom platí*

$$\text{kard } M_1 = \text{kard } M.$$

Nadväzujúc na terminológiu, používanú v [8] a [9] budeme hovoriť, že intervaly $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle$ sväzu S sú zdola priamo podobné, ak existuje interval $\langle u, v \rangle \subset S$ taký, že platí

$$a \cap v = u, \quad a \cup v = b, \quad c \cap v = u, \quad c \cup v = d.$$

Hovoríme, že vo sväze S je splnená veta Jordan—Hölderova s dolnou podobnosťou prvointervalov [stručne: veta (JH)], keď platí:

Ak $R_1(a, b), R_2(a, b)$ sú maximálne reťazce vo sväze S a ak $M_1, \text{ resp. } M_2$ je množina všetkých prvointervalov reťazca $R_1(a, b), \text{ resp. } R_2(a, b)$, existuje jedno-jednoznačné zobrazenie množiny M_1 na M_2 také, že intervaly, ktoré si navzájom prislúchajú v tomto zobrazení, sú zdola priamo podobné. (Porov. [9], def. 1.1.)

Poznámka. Ak 0 je najmenší prvok sväzu S a ak každý z intervalov $\langle a, b \rangle, \langle a', b' \rangle$ je transponovaný s intervalom $\langle 0, c \rangle$, potom intervaly $\langle a, b \rangle, \langle a', b' \rangle$ sú zrejme zdola priamo podobné.

Lemma 9. *Nech S je úplná Boolova algebra. Potom v S je splnená veta (JH).*

Dôkaz. Nech $a, b \in S, a < b$. Potom sväz $S_1 = \langle a, b \rangle$ je úplnou Boolovou algebrou. Nech $R_1(a, b), R_2(a, b)$ sú maximálne reťazce v S_1 , nech M je množina všetkých atómov v S_1 . Nech $M_1, \text{ resp. } M_2$ je množina všetkých prvointervalov reťazca $R_1(a, b), \text{ resp. } R_2(a, b)$. Podľa dôkazu lemy 7 existuje prosté zobrazenie množiny M_1 na množinu M

$$\langle a_1, b_1 \rangle \rightarrow c \tag{5}$$

($\langle a_1, b_1 \rangle \in M_1, c \in M$) také, že intervaly $\langle a_1, b \rangle, \langle 0, c \rangle$ sú transponované. Podľa dôkazu lemy 5" existuje prosté zobrazenie množiny M na M_2

$$c \rightarrow \langle a', b' \rangle \tag{6}$$

($c \in M, \langle a', b' \rangle \in M_2$) také, že intervaly $\langle 0, c \rangle, \langle a', b' \rangle$ sú transponované. Zobrazenie

$$\langle a_1, b_1 \rangle \rightarrow \langle a', b' \rangle \tag{7}$$

množiny M_1 na M_2 , vzniknuté zložením zobrazení (5). (6). je zrejme prostým zobrazením M_1 na M_2 ; podľa už dokázaného a podľa poznámky pred lemmou 9 intervaly, ktoré si navzájom prislúchajú v zobrazení (7), sú zdola priamo podobné.

Poznámky.

1. Neúplná Boolova algebra nemusí spĺňovať vetu (JH). (Porovnaj príklad 2.)
2. V práci [9] sa vyšetrovala platnosť vety (JH) pre sväzy, ktoré nemuseli byť Boolovými algebrami. Z výsledkov práce [9] (porov. [9], veta 1.11) ne-

vyplýva lemma 9, keďže úplná Boolova algebra nemusí spĺňovať podmienku označovanú v [9] ako podmienka III (porov. [9], definícia 1.6).

LITERATÚRA

- [1] G. Birkhoff, Lattice theory, revised edition, Amer. Math. Soc. Colloquium Publications Vol. XXV, New York 1948.
- [2] R. Croisot, Contribution à l'étude des treillis semi-modulaires de longueur infini. Annales Sci. École Normal Sup. 68 (1951), 203—265.
- [3] G. Szász, On the structure of semi-modular lattices of infinite length, Acta scientiarum math., 14, (1951/52), 239—245.
- [4] G. Szász, Generalization of a theorem of Birkhoff, Acta scientiarum mathem. 16, (1955), 89—91.
- [5] J. Jakubík, On the Jordan—Dedekind chain condition, Acta scientiarum mathem. 16 (1955), 266—269.
- [6] J. Jakubík, Poznámka o Jordan—Dedekindovej podmienke v Boolových algebrách, Časopis pro pěstování matem., 82 (1957), 44—45.
- [7] G. Grätzer—E. T. Schmidt, On the Jordan—Dedekind chain condition, Acta scientiarum mathem., 18 (1957), 52—56.
- [8] Vl. Kořínek, Lattices in which the theorem of Jordan—Hölder is generally true. Bulletin int. de l'Acad. tcheque des Sciences No 23 (1949).
- [9] V. Wilhelm, Теорема Жордана-Гельдера в структурах без условия конечности цепей. Чехослов. мат. журнал 4 (79), (1954) 29—49.
- [10] R. Sikorski, On an unsolved problem from the theory of Boolean algebras. Colloquium mathem II (1951) 27—29.

Došlo 26. 4. 1958.

*Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Vysokej školy technickej v Košiciach*

О ЦЕНАХ В БУЛЕВЫХ АЛГЕБРАХ

Я Н ЯКУБИК

Выводы

Пусть S — структура. Цепь $R \subset S$ называется максимальной в S , если для каждой цепи $R' \subset S$ из соотношения $R \subset R'$ вытекает $R = R'$. Если M — множество, обозначи, через $\text{kard } M$ кардинальное число множества M .

Пусть S_0 — булева алгебра, образованная всеми подмножествами счетного множества A , пусть J — идеал в S_0 , образованный всеми конечными подмножествами из A , $S = S_0/J$. Пусть R — максимальная цепь в S , $k = \text{kard } R$.

Теорема. Пусть α — кардинальное число, $\alpha \geq k$. Существует булева алгебра S_α такая, что для каждого кардинального числа β , $k \leq \beta \leq \alpha$, существует максимальная цепь $R_\beta \subset S_\alpha$, для которой $\text{kard } R_\beta = \beta$.

Далее доказываются утверждения:

Пусть в булевой алгебре S не существует атом. Тогда в максимальной цепи $R \subset S$ не существует простой интервал.

Пусть R — максимальная цепь в полной булевой алгебре S . Пусть M — множество всех атомов в S и M_1 — множество всех простых интервалов цепи R . Тогда $\text{kard } M = \text{kard } M_1$.

Построен пример полной дистрибутивной структуры S с максимальной цепью $R \subset S$ так, что в S существует атом и в R не существует простой интервал. Далее построен пример не полной булевой алгебры S с максимальной цепью $R \subset S$ так, что в S существует атом и в R не существует простой интервал.

ÜBER KETTEN IN BOOLESCHEN VERBÄNDEN

JÁN JAKUBÍK

Zusammenfassung

S sei ein Verband. Eine Kette $R \subset S$ ist maximal in S , wenn für jede Kette $R_1 \subset S$ aus der Beziehung $R \subset R_1$ die Gleichung $R = R_1$ folgt. Wenn $M \subset S$, bedeutet $\text{kard } M$ die Mächtigkeit der Menge M . Wenn $a, b \in S$ benachbarte Elemente sind, $a < b$, sagen wir, daß $\langle a, b \rangle$ ein Primintervall in S ist.

Es sei S_0 ein Boolescher Verband, der von allen Untermengen einer abzählbaren Menge A gebildet ist. J sei der Ideal aller endlichen Untermengen von A , $S = S_0/J$. R sei eine beliebige maximale Kette in S , $k = \text{kard } R$.

Satz. Für jede Mächtigkeit α , $\alpha \geq k$ gibt es ein Boolescher Verband S_α mit dieser Eigenschaft: zu jeder Mächtigkeit β , $k \leq \beta < \alpha$, existiert in S_α eine maximale Kette R_β , $\text{kard } R_\beta = \beta$.

Weiter werden folgende Behauptungen bewiesen:

Wenn in einem Booleschen Verband S kein Atom existiert, dann ist jede maximale Kette $R \subset S$ in sich dicht.

Wenn in einem vollständigen Booleschen Verband S ein Atom existiert, dann gibt es in jeder maximalen Kette $R \subset S$ ein Primintervall.

Es sei R eine maximale Kette in einem vollständigen Booleschen Verband S . Es sei M die Menge aller Atome in S und es sei M_1 die Menge aller Primintervallen der Kette R . Dann gilt

$$\text{kard } M = \text{kard } M_1.$$

Es wird ein Beispiel eines vollständigen distributiven Verbandes S mit einer maximalen Kette $R \subset S$ konstruiert, wobei in S ein Atom existiert und in R gibt es kein Primintervall. Weiter wurde ein Beispiel eines (nicht vollständigen) Booleschen Verbandes S mit einer maximalen Kette $R \subset S$ konstruiert wobei in S ein Atom enthalten ist und in R gibt es kein Primintervall.