

Rozhledy matematicko-fyzikální

Úlohy domácího kola 57. ročníku Matematické olympiády pro žáky středních škol

Rozhledy matematicko-fyzikální, Vol. 82 (2007), No. 1, 46–49

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/146186>

Terms of use:

© Jednota českých matematiků a fyziků, 2007

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://dml.cz>

SOUTĚŽE

Úlohy domácího kola 57. ročníku Matematické olympiády pro žáky středních škol

KATEGORIE A

1. Najděte všechny trojice reálných čísel a, b, c s vlastností: Každá z rovnic

$$x^3 + (a + 1)x^2 + (b + 3)x + (c + 2) = 0,$$

$$x^3 + (a + 2)x^2 + (b + 1)x + (c + 3) = 0,$$

$$x^3 + (a + 3)x^2 + (b + 2)x + (c + 1) = 0$$

má v oboru reálných čísel tři různé kořeny, celkem je to však pouze pět různých čísel. (Jaromír Šimša)

2. V rovině je dána úsečka AV a ostrý úhel velikosti α . Určete množinu středů kružnic opsaných všem těm trojúhelníkům ABC s vnitřním úhlem α při vrcholu A , jejichž výšky se protínají v bodě V .

(Pavel Leischner)

3. Množinu M tvoří $2n$ navzájem různých kladných reálných čísel, kde $n \geq 2$. Uvažujme n obdélníků, jejichž rozměry jsou čísla z M , přičemž každý prvek z M je použit právě jednou. Určete, jaké rozměry mají tyto obdélníky, je-li součet jejich obsahů

a) největší možný; b) nejmenší možný. (Jaroslav Švrček)

4. Určete počet konečných rostoucích posloupností přirozených čísel a_1, a_2, \dots, a_k všech možných délek k , pro které platí $a_1 = 1$, $a_i \mid a_{i+1}$ pro $i = 1, 2, \dots, k - 1$ a $a_k = 969\,969$. (Martin Panák)

5. Je dána kružnice k , bod O , který na ní neleží, a přímka p , která ji neprotíná. Uvažujme libovolnou kružnici l , která má vnější dotyk s kružnicí k a dotýká se i přímky p . Příslušné body dotyku označme

A a B . Pokud body O , A , B neleží v přímce, sestrojíme kružnici m opsanou trojúhelníku OAB . Dokažte, že všechny takové kružnice m mají další společný bod různý od bodu O , anebo se dotýkají téže přímky. (Ján Mazák)

6. Dokažte, že pro každé přirozené číslo n existuje celé číslo a ($1 < a < 5^n$) takové, že platí $5^n \mid a^3 - a + 1$. (Ján Mazák)

KATEGORIE B

1. Najděte všechna přirozená čísla k , pro něž je zápis čísla $6^k \cdot 7^{2007-k}$ v desítkové soustavě zakončen dvojčíslím a) 02; b) 04. (Eva Řídká)

2. V pásu mezi rovnoběžkami p , q jsou dány dva různé body M a N . Sestrojte kosočtverec nebo čtverec, jehož dvě protější strany leží na přímkách p a q a zbylé dvě strany procházejí body M a N (každá jedním). (Jaromír Šimša)

3. Jsou-li x a y reálná čísla, pro něž platí $x^3 + y^3 \leq 2$, potom $x + y \leq 2$. Dokažte. (Ján Mazák)

4. Najděte všechny pravoúhlé trojúhelníky s délkami stran a , b , c a délkami těžnic t_a , t_b , t_c , pro něž platí $a + t_a = b + t_b$. Uvažujte oba případy, kdy AB je a) přepona, b) odvěsna. (Pavel Novotný)

5. Určete všechny dvojice a , b reálných čísel, pro něž má každá z kvadratických rovnic

$$ax^2 + 2bx + 1 = 0,$$

$$bx^2 + 2ax + 1 = 0$$

dva různé reálné kořeny, přičemž právě jeden z nich je oběma rovnicím společný. (Jaroslav Švrček)


6. Obdélník $2\,005 \times 2\,007$ je rozdělen na černé a bílé jednotkové čtverčky. Dokažte, že pak pro některou z barev (černou nebo bílou) existuje více než 95 800 pravoúhelníků širokých aspoň 2, jež se

SOUTĚŽE

skládají z jednotkových čtverečků, navzájem se nepřekrývajících, a jejichž rohová políčka mají tuto barvu. (Pavel Leischner)

KATEGORIE C

- Určete nejmenší přirozené číslo n , pro něž i čísla $\sqrt{2n}$, $\sqrt[3]{3n}$, $\sqrt[5]{5n}$ jsou přirozená. (Jaroslav Švrček)
- Čtyřúhelníku $ABCD$ je vepsána kružnice se středem S . Určete rozdíl $|\angle ASD| - |\angle CSD|$, jestliže $|\angle ASB| - |\angle BSC| = 40^\circ$. (Jaromír Šimša)
- Máme určitý počet krabiček a určitý počet kuliček. Dáme-li do každé krabičky právě jednu kuličku, zbyde nám n kuliček. Když však dáme právě n krabiček stranou, můžeme všechny kuličky rozmístit tak, aby jich v každé zbývající krabičce bylo právě n . Kolik máme krabiček a kolik kuliček? (Vojtech Bálint)
- Tangram je skládačka, kterou lze vyrobit z papíru rozřezáním vystřiženého čtverce na sedm dílů podle čar vyznačených na



obrázku. Předpokládejme, že délka strany čtverce je $2\sqrt{2}$ cm. Rozhodněte, zda lze z dílů tangramu složit:

- obdélník $2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$,
- obdélník $\sqrt{2} \text{ cm} \times 4\sqrt{2} \text{ cm}$.

(Pavel Leischner)

5. Ve skupině n lidí ($n \geq 4$) se někteří znají. Vztah „znát se“ je vzájemný: jestliže osoba A zná osobu B , pak také B zná A a nazýváme je dvojicí známých.
- Jestliže mezi každými čtyřmi osobami jsou aspoň čtyři dvojice známých, pak každé dvě osoby, které se neznají, mají společného známého. Dokažte.
 - Zjistěte, pro která $n \geq 4$ existuje skupina osob, v níž jsou mezi každými čtyřmi osobami aspoň tři dvojice známých a současně se některé dvě osoby neznají ani nemají společného známého.
 - Rozhodněte, zda ve skupině šesti osob mohou být v každé čtveřici právě tři dvojice známých a právě tři dvojice neznámých.

(Ján Mazák)

6. Klárka měla na papíru napsáno trojmístné číslo. Když ho správně vynásobila devíti, dostala čtyřmístné číslo, jež začínalo touž číslicí jako číslo původní, prostřední dvě číslice se rovnaly a poslední číslice byla součtem číslic původního čísla. Které čtyřmístné číslo mohla Klárka dostat?

(Peter Novotný)

* * * * *

STREDOVEKÁ ZBIERKA ÚLOH



Ani v „temnom“ stredoveku nebola matematika mŕtva. Na dvore Karola Veľkého v Aachene okolo roku 775 sa používala jedna z prvých zbierok zaujímavých úloh z matematiky s podnetným názvom *Úlohy na cibrenie umu mladých*. Jej autorom bol učiteľ, filozof i básnik Alcuin z Yorku (asi 735–804, pôvodným keltským menom Alwin, tj. priateľ chrámu). Už v tejto učebnici sa vyskytuje známa úloha o pltníkovi, vlkovi, koze a kapuste. Skúste zdokonaľiť svoje myslenia vyriešením úlohy: Ako rozdeliť 100 mincí medzi 100

osôb, aby muži dostali po troch, ženy po dvoch a každé dve deti spolu po jednej minci. Už vo svojej dobe vzdelanec Alcuin vedel: „Rozumne sa pýtať, znamená vyučovať.“

Dušan Jedínák