

26. ročník matematické olympiády

IV. Úlohy II. kola

In: Jan Vyšín (editor); Jiří Mída (editor); Jozef Moravčík (editor); Lev Bukovský (editor): 26. ročník matematické olympiády. (Czech). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. pp. 92–126.

Terms of use:

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/404687>

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://dml.cz>

V. Úlohy III. kola kategorie A

A – III – 1

V kocke s hranou velikosti 1 je daných 2050 bodov. Dokážte, že medzi nimi existuje päť takých, ktoré ležia vo vnútri gule s polomerom $\frac{1}{9}$.


Riešenie. Celú kocku so stranou 1 môžeme rozdeliť na 512 kociek so stranou dĺžky $\frac{1}{8}$. Keďže $4 \cdot 512 = 2048 < 2050$, musí podľa Dirichletovho priehradkového princípu existovať medzi nimi aspoň jedna, ktorá obsahuje najmenej päť z daných bodov. Ak tejto kocke opíšeme guľovú plochu, pre jej polomer r platí

$$r = \frac{\sqrt{3}}{16} = \sqrt{\frac{3}{256}} < \sqrt{\frac{3}{255}} = \frac{1}{\sqrt{85}} < \frac{1}{\sqrt{81}} = \frac{1}{9}.$$

A – III – 2

Jsou dána kladná čísla p a q . Sestrojte pravoúhlý rovnoběžník $ABCD$ tak, aby platilo $AE = p$, $AF = q$, kde E a F jsou po řadě středy stran BC a CD . Udejte podmínky řešitelnosti.

Řešení (obr. 28). *Rozbor:* Označme P bod polopřímky AF , pro který platí $AP = 2 \cdot AF$, a dále Q střed úsečky AF . Protože $QE \perp BC$ a dále $P \in BC$, leží E na Thaletově



Obr. 28

kružnici nad úsečkou PQ . Zároveň ovšem E leží na $k_2 = (A; p)$. Odtud plyne *konstrukce*: Vyjdeme od úsečky AF délky q . Sestrojíme body P a Q tak, jak je uvedeno v rozboru, dále Thaletovu kružnici k_1 a kružnici $k_2 = (A; p)$. Jejich průsečík je bod E . Vrcholy B a C jsou pak paty kolmic z A a F na PE . Potom lichoběžník $ABCF$ doplníme na pravoúhlý rovnoběžník $ABCD$. *Zkouška:* Přímo z konstrukce vyplývá, že $AF = q$ a $AE = p$. Zřejmě E je tedy střed strany BC , neboť QE je střední příčka lichoběžníku $ABCF$. Dále je F středem strany CD , neboť CF je střední příčka trojúhelníku ABP , takže $CF = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CD$.

Podmínkou řešitelnosti je existence dvou společných bodů kružnic k_1 a k_2 (E nesmí být na přímce AP). Protože

středná obou kružnic má délku $\frac{5}{4}q$ a poloměry jsou p a $\frac{3}{4}q$, je úloha řešitelná, platí-li

$$p - \frac{3}{4}q < \frac{5}{4}q < p + \frac{3}{4}q$$

neboli

$$p < 2q \quad \text{a} \quad q < 2p,$$

tj.

$$\frac{p}{2} < q < 2p.$$

A — III — 3

Vyšetřete a v Gaussově rovině komplexních čísel graficky znázorněte množinu hodnot, jichž může nabýt součet $S = Z + W$ dvou komplexních jednotek Z a W , pro něž zároveň platí:

$$\operatorname{Im} Z \geq 0 \quad \text{a} \quad \operatorname{Re} W \geq 0.$$

Poznámka: $\operatorname{Im} Z$ značí imaginární část čísla Z , $\operatorname{Re} W$ vyjadřuje reálnou část čísla W .

Řešení. Čísla Z a W napíšme ve tvaru

$$Z = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad (1)$$

$$W = \cos \psi + i \sin \psi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}. \quad (2)$$

Položme

$$\omega = \frac{1}{2}(\varphi + \psi), \quad \varepsilon = \frac{1}{2}(\varphi - \psi), \quad (3)$$

takže

$$\omega + \varepsilon = \varphi, \quad \omega - \varepsilon = \psi. \quad (4)$$

Vzhledem k (1) a (2) pak je

$$-\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{3}{4}\pi, \quad -\frac{\pi}{4} \leq \varepsilon \leq \frac{3}{4}\pi. \quad (5)$$

Součet $S = Z + W$ nyní můžeme vyjádřit ve tvaru

$$S = (\cos \varphi + \cos \psi) + i(\sin \varphi + \sin \psi).$$

Podle známých vzorců odtud dostáváme

$$S = 2 \cdot \cos \varepsilon \cdot (\cos \omega + i \sin \omega). \quad (6)$$

Přitom $\cos \omega + i \sin \omega$ je komplexní jednotka s argumentem ω a $|S| = 2 \cdot |\cos \varepsilon|$.

Dále zjistíme, jakých hodnot může nabývat ε při dané hodnotě ω . Dosadíme-li podle (4) do nerovností (1) a (2), pak s přihlédnutím k nerovnostem (5) snadno poznáme, že


$$\text{pro } -\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{\pi}{4} \text{ je } -\omega \leq \varepsilon \leq \omega + \frac{\pi}{2}, \quad (7)$$

$$\text{pro } \frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{3}{4}\pi \text{ je } \omega - \frac{\pi}{2} \leq \varepsilon \leq \pi - \omega. \quad (8)$$

Dále pro takto vymezené hodnoty ε nalezneme maximální a minimální hodnoty $2 \cdot \cos \varepsilon$:

$$\text{pro } -\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq 0 \text{ je } -2 \sin \omega \leq 2 \cos \varepsilon \leq 2 \cos \omega, \quad (9)$$

$$\text{pro } 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{4} \text{ je } -2 \sin \omega \leq 2 \cos \varepsilon \leq 2, \quad (10)$$



Obr. 29

pro $\frac{\pi}{4} \leq \omega \leq \frac{\pi}{2}$ je $-2 \cos \omega \leq 2 \cos \varepsilon \leq 2$, (11)

pro $\frac{\pi}{2} \leq \omega = \frac{3}{4}\pi$ je $-2 \cos \omega \leq 2 \cos \varepsilon \leq 2 \sin \omega$. (12)

Poněvadž v udaných mezích lze φ a ψ , resp. ω a ε , volit zcela libovolně, je hledanou množinou hodnot součtu $Z + W$ právě množina všech čísel tvaru (6), kde ω splňuje (5) a $2 \cdot \cos \varepsilon$ leží v mezích udaných příslušnou nerovností (9) až (12). Tím je vlastně tato množina popsána v polárních souřadnicích. Grafické znázornění je na obr. 29.

Poznámka. Při řešení lze využít symetrie podle osy 1. a 4. kvadrantu.

Nájdite všetky reálne riešenia sústavy rovníc

$$x + y + z = 3, \quad (1)$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{5}{12}, \quad (2)$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 45. \quad (3)$$

Riešenie. Ak nejaká trojica x, y, z vyhovuje danej sústave, potom musí zrejme byť $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$. Z (2) dostaneme

$$xy + yz + zx = \frac{5}{12} xyz. \quad (4)$$

Zrejme platí:

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y + z)(xy + yz + zx) - 3xyz,$$

z čoho po dosadení z (1), (3), (4) a jednoduchej úprave dostaneme

$$xyz = -24, \quad (5)$$

odkiaľ po dosadení do (4) hneď príde

$$xy + yz + zx = -10. \quad (6)$$

Z (1), (6), (5) vyplýva na základe známych vzťahov medzi koreňmi a koeficientami kubickej rovnice, že x, y, z vyhovujúce danej sústave musia byť koreňmi rovnice

$$u^3 - 3u^2 - 10u + 24 = 0. \quad (7)$$

Kedže $u^3 - 3u^2 - 10u + 24 = (u - 2)(u^2 - u - 12) =$
 $= (u - 2)(u + 3)(u - 4)$, rovnici (7) vyhovují čísla
 $2, -3, 4$.

Dosadením sa ľahko presvedčíme, že všetky permutácie
čísel tejto trojice sú riešeniami danej sústavy. Sú to:

$(2, -3, 4), (2, 4, -3), (-3, 2, 4), (-3, 4, 2), (4, 2, -3),$
 $(4, -3, 2)$.


A — III — 5

Na prímkce jsou dány navzájem různé body A_1, A_2, \dots, A_n . Každý z nich označíme právě jednou ze čtyř barev tak, aby bylo každé barvy použito. Dokažte, že pak v dané přímce existuje úsečka, která obsahuje právě po jednom bodu některých dvou z uvedených barev a alespoň po jednom bodu obou zbylých barev.

Řešení. Můžeme předpokládat, že body následují v přímce za sebou v pořadí A_1, A_2, \dots, A_n . Necht k je nejmenší index takový, že mezi body A_1, A_2, \dots, A_k už jsou body všech čtyř barev. Má tedy A_k jinou barvu než kterýkoli z bodů A_1, A_2, \dots, A_{k-1} . Označme j největší index takový, že $1 \leq j \leq k - 1$ a že mezi body A_j, A_{j+1}, \dots, A_k už jsou body všech čtyř barev. Má tedy A_j jinou barvu než kterýkoli z bodů $A_{j+1}, A_{j+2}, \dots, A_k$. Úsečka $A_j A_k$ už má požadovanou vlastnost, neboť barvy bodů A_k a A_j se vyskytují mezi body A_j, A_{j+1}, \dots, A_k právě jednou a zbylé dvě barvy aspoň jednou.

Je dána krychle $ABCD A' B' C' D'$, $AA' \parallel BB' \parallel CC' \parallel DD'$; střed stěny $ABCD$ označme S . Určete všechny body X , které mají zároveň tyto dvě vlastnosti:

1. X náleží některé hraně dané krychle;
2. čtyřstěny $ABDX$ a $CB'SX$ mají objemy sobě rovné.



Obr. 30

Řešení. Uvažujme krychli o hraně délky 1 (obr. 30). Obsah $\triangle ABD$ je $P_1 = \frac{1}{2}$. Přímka AC je kolmá na rovinu DBB' , a proto obsah $\triangle CB'S$ je

$$P_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{4} \sqrt{3}.$$

Označme vzdálenosti hledaného bodu X od rovin ABD a $CB'S$ po řadě d_1, d_2 . Pak čtyřstěny $ABDX$ a $CB'SX$

mají po řadě objemy $V_1 = \frac{1}{6} d_1$ a $V_2 = \frac{1}{12} d_2 \sqrt{3}$. Z 2. vlastnosti bodu X plyne

$$2d_1 = d_2 \sqrt{3}. \quad (1)$$

Zvolme ortonormální soustavu souřadnic tak, že $A = [0, 0, 0]$, $B = [1, 0, 0]$, $D = [0, 1, 0]$, $A' = [0, 0, 1]$. Nechť $X = [u, v, w]$ je hledaný bod. Bod X leží na některé z hran dané krychle a je vrcholem čtyřstěnu $ABDX$, a proto

$$w > 0. \quad (2)$$

Pro vzdálenost d_1 bodu X od roviny ABC tedy platí

$$d_1 = w. \quad (3)$$

Rovina ACB' má rovnici

$$x - y - z = 0, \quad (4)$$

takže vzdálenost bodu X od roviny SCB' je

$$d_2 = \frac{|u - v - w|}{\sqrt{3}}. \quad (5)$$

Podle (1), (3), (5) dostáváme

$$2w = |u - v - w|. \quad (6)$$

Nyní rozlišíme dva případy:

a) Nechť $u - v - w > 0$. Z podmínky (2), z rovnice (4) roviny ACB' a z toho, že $B = [1, 0, 0]$, plyne, že v tomto případě hledaný bod X leží uvnitř klínu určeného polovinami ACB a ACB' . Bod X může tedy ležet jedinečně

na hraně BB' , tzn., že pro jeho souřadnice platí: $u = 1$, $v = 0$. Podle (6) pak $w = \frac{1}{3}$.

Pro bod $X = \left[1, 0, \frac{1}{3}\right]$ je $d_1 = \frac{1}{3}$, $d_2 = \frac{2}{3\sqrt{3}}$. Potom je $V_1 = V_2 = \frac{1}{18}$.

b) Necht' $u - v - w < 0$. Obdobně jako v případě a) se zjistí, že hledaný bod X leží uvnitř klínu určeného polorovinami ACD a ACB' . Z podmínky (2) a rovnice (6) plyne, že bod X leží v otevřené polorovině, jež má početní vyjádření

$$x - y + z = 0 \quad \wedge \quad z > 0. \quad (7)$$

Její hraniční přímka je AC .

Nejprve je třeba zjistit, zda tato polorovina protíná hranu DD' . Pro bod X ležící na DD' by platilo $u = 0$ a $v = 1$, takže po dosazení do (7) máme $z = w = 1$, tj. $X = D'$. Pro tento bod X je $d_1 = 1$, $d_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}$, takže $V_1 = V_2 = \frac{1}{6}$.

Tedy bod D' splňuje podmínky úlohy. Otevřená polorovina ACD' nemá mimo bod D' s hranami dané krychle žádné další společné body.

Závěr: Existují právě dva body X s požadovanými vlastnostmi, jedním z nich je bod D' a druhý leží na hraně BB' , přičemž jeho vzdálenost od bodu B je $\frac{1}{3}BB'$.